# Ablesungen von Weißstorchringen in Mecklenburg-Vorpommern 2019-22

Stefan Kroll, Rostock

# Ableser von Weißstorchringen in MV 2019-22

Ulf Bähker, Matthias Bräse, Markus Cravaak, Michael Dering, Klaus-Jürgen Donner, Helmut Eggers, Wilhelm Erichson, Andreas Fiebelkorn, Gunnar Gernhöfer, Hans-Dieter Graf, Thomas Heinicke, Aaron Hofmann, Steffen Hollerbach, Wolfgang John, Frank Joisten, Jens Köhler, Stefan Kroll, Jens Krüger, Frank Liebig, Wolfgang und Sabine Marquardt, Michael Modrow, Jörg Mohnhaupt, Karsten Peter, Simon Piro, Anke Sandhoff, Tom Sandhoff, Reiner Schmahl, Reinhard Schaugstat, Wolfgang Schmidt, Rolf-Rüdiger Strache, Frank Tetzlaff, Michael Tetzlaff, Paul Thomzick, Friedhelm Ziemann

sowie weitere (mir) namentlich nicht bekannte, aufgrund von Direkt-Meldungen an die BZ Hiddensee

Quelle für alle nachfolgenden Statistiken:
Beringungszentrale Hiddensee, Güstrow

# Abb. 1: Weißstorch-Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern 1996-2021



# Abb. 2: Beringte Jungstörche in Mecklenburg-Vorpommern 1996-2021 (Anteile in Prozent)



# Abb. 3: Abgelesene beringte Brutstörche in MV 1996-2022



# Abb. 4: Abgelesene beringte Brutstörche in MV 2022 (blaue „Tropfen“)


Google My Maps
Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft
Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See - Landkreis Müritz
Nossentiner/ Schwinzer Heide
Mecklenburger Großseenland
Brohmer Berge
Feldberger Seenlandschaft
Uckermärkische Seenlandschaft
Naturpark Uckermärkische Seen
Mecklenburgisches Elbetal
Niedersächsische Elbtalaue
Stettiner Haff
Lübeck
Schwerin
Rostock
Wismar
Güstrow
Stralsund
Greifswald
Neubrandenburg
Anklam
Waren (Müritz)
Parchim
Sassnitz
Bergen auf Rügen
Heringsdorf
Swinemünde
Ueckermünde
Pasewalk
Strasburg (Uckermark)
Prenzlau
Templin
Lauenburg/ Elbe
Lüneburg
Dömitz
Ludwigslust
Elbe

# Abb. 5: Herkunft beringte Brutstörche in MV 2022



# Abb. 6: Status der beringten Brutstörche 2022

(n = 155)



# Abb. 7: Status der beringten Brutstörche 2012-2022



# Abb. 8: Rückkehrquoten der Brutstörche MV in der Folgesaison (RQ+1) / nach letztem Stand (RQ+n)



# Abb. 9: Lebensalter der beringten Brutstörche in MV 2022
# (n = 155)



# Abb. 10: Alter der „Erstbrüter“ in MV 2022 (n = 36)



# Abb. 11: Flügge Jungstörche in den für M-V wichtigsten Herkunftsgebieten 2010-2020



Abb. 12: Hiddensee BW 40 - beringt 2018 in Freudenberg/NVP
2021: 1. Nachweis eines ostdeutschen Weißstorchs in Norwegen (4.6.)
2022: Brutvogel in Ducherow/OVP, abgelesen von A. Fiebelkorn


Uppsala
Drammen
Västerås
Haugesund
Karlstad
Stockholm
Telemarkskanalen regionalpark
Örebro
Stavanger
Sandnes
Norrköping
Ostsee
Saarem
Linköping
Kristiansand
Göteborg
Jönköping
Gotland
Vendsyssel
Aalborg
Nordsee
Aarhus
Jylland
Kopenhagen
Klaipėda
Dänemark
Sjælland
Malmö
Odense
Władysławowo
Kaliningrad
Калининград
Gdynia
Kiel
Kolberg
Rostock
Danzig
Lübeck
Olsztyn
Hamburg
Stettin
Groningen
Bremen
Bydgoszcz
Bia
Polen
Berlin
Amsterdam
Hannover
Posen
Cambridge
Warschau
Den Haag
Niederlande
Łódź
Rotterdam
London
Dortmund

# Abb. 13: Hiddensee XP373 gelb
# – ein Sonderfall: mit 3 Jahren Brutvogel im Geburtsnest!
# Testorf Ausbau/Altkreis Ludwigslust



**Horststandort:**
Testorf Ausbau

**Horstunterlage:**
Nestmast

**Ort (Gemeinde/Stadt):**
Testorf Ausbau (Zarrentin am Schaalsee)

**Koordinaten:** X: 10.8766, Y: 53.5537

**Status:**
2022: Horstpaar mit 2 flüggen Jungen
2021: Horstpaar ohne flügge Junge
2020: Horstpaar mit 1 flüggen Jungen
Infos zum Brutverlauf

**Adulte Störche im Jahr 2022:**
Storch A: unberingt
Storch B: DEH XP393

**Betreuungsregion:**
Landkreis Ludwigslust (alt)



**Lifelist des Ringstorches *DEH XP393 (XP393 gelb)* | Jahr der Beringung: 2019 | Ort der Beringung: Testorf Ausbau | Geschlecht: unbekannt | Zugverhalten: unbekannt**

| Jahr | Nest | Typ | Brut-status | Ankunft 1. Storch | Ankunft 2. Storch | Ring Brut-storch A | Ring Brut-storch B | Taube Eier im Horst | Abwurf Eier | Abwurf Junge | Flügge Junge | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Testorf Ausbau | Brutstorch | HP | | | unberingt | DEH XP393 | | | | 2 | Landkreis Ludwigslust (alt) |

Abb. 14: Über 9.000 Kilometer Luftlinie im ersten Lebensjahr:
Jungstorch Hiddensee XT845 – von Rostock nach Südafrika, Dezember 2021




Dänemark
Vereinigtes Königreich
Irland
Belarus
Polen
Deutschland
Ukraine
Kasachstan
Österreich
Frankreich
Rumänien
1.000 km
Italien
Usbekistan
Kirgis
Spanien
Griechenland
Türkei
Turkmenistan
Portugal
2.000 km
Tunesien
Syrien
Irak
Afghanistan
Iran
Marokko
Pakistan
Algerien
Libyen
3.000 km
Ägypten
Westsahara
Saudi-Arabien
Oman
Mauretanien
Mali
Niger
4.000 km
Tschad
Sudan
Jemen
Golf von Aden
Arabisches Meer
Burkina Faso
Guinea
Nigeria
Ghana
5.000 km
Südsudan
Äthiopien
Golf von Guinea
Somalia
Kenia
Gabun
6.000 km
Demokratische Republik Kongo
Tansania
7.000 km
Angola
Sambia
Mosambik
Namibia
8.000 km
Simbabwe
Botsuana
Madagaskar
9.037 km
Südafrika
Südatlantik

Abb. 15: Aktuelle Position von 28 besenderten Störchen
aus Nord- und Ostdeutschland sowie Dänemark, Stand: 6.10.2022


Paris
Slowakei
Ukraine
Österreich
Moldawien
Ungarn
Frankreich
Rumänien
Kroatien
Serbien
Schwarzes Meer
Italien
Rom
Bulgarien
Georgien
Portugal
Madrid
Tyrrhenisches Meer
Istanbul
Ankara
Aserbaidschan
Lissabon
Spanien
Griechenland
Türkei
Turkm
Syrien
Libanon
Tunesien
Mittelmeer
Irak
Marokko
Kairo
القاهرة
danien
Iran
Algerien
Libyen
Ägypten
Persischer Golf
Riad
الرياض
Westsahara
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Rotes Meer
Oman
Mauretanien
Mali
Niger
Sudan
Senegal
Tsch
Eritrea
Jemen
Gambia
Burkina Faso
Guinea-Bissau
Dschibuti
Guinea
Benin
Nigeria
Sierra Leone
Togo
Äthiopien
Ghana
Lagos
Zentralafrikanische Republik
Südsudan
Liberia

Quelle:
www.movebank.org
https://blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen


USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE
NOAA
FEWS NET
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK
30°N
20°N
10°N
0°
10°S
20°S
30°S
10°W
0°
10°E
20°E
30°E
40°E
50°E
4
4
2
3
3
3
1
5
Legend
Flooding
Drought
Abnormal Dryness
Severe Drought
Tropical Cyclone
Potential Locust Outbreak
Heavy Snow
Abnormal Cold
Abnormal Heat
Elevation
High
Low

**Climate Prediction Center's Africa Hazards Outlook**
**For USAID / FEWS-NET**
**06 October – 12 October, 2022**

- Flooding have impacted many people over many areas in western and eastern Africa.

1) After 12 weeks of sub-standard rain and prolonged, large moisture deficits, drought is placed in southern Ethiopia.
2) Ongoing heavy and above-average rainfall has saturated soils and elevated river flows, leading to flooding in several cities in southern Niger, northern Nigeria, far north region of Cameroon, Chad, Central African Republic, and the Darfur region of Sudan.
3) Heavy seasonal rainfall has resulted in flooding, fatalities, and many people affected over the Nile river basin in Sudan, Sudd Wetland areas of South Sudan, northeastern Ethiopia, Eritrea, and Djibouti. 15 states and more than 225 thousand people have been affected by flooding in recent weeks. Flooded areas extend along the entire path of Niger and Benue Rivers which has led to flooding in central Nigeria. The forecasted additional rain maintains high risks for flooding in the region.
4) Flooding is progressing downstream along the Senegal River, also flood conditions remains constant in Central Mali, and conditions have improved along the White Volta in Ghana. These have contributed to the floods reported over these areas.
5) Around 50% or less of normal rainfall during the last 30 days has led to degrading vegetation health in southeastern Nigeria.

Abb. 16: Aktuelle Niederschlagssituation in den afrikanischen Überwinterungsgebieten der Weißstörche

Quelle: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa_hazard.pdf (6.10.2022)